

POVJERENSTVO ZA BOLNIČKE INFEKCIJE
THALASSOTHERAPIA OPATIJA
M.Tita 188/1
51410 Opatija

»THALASSOTHERAPIA« - Specijalna bolnica
za medicinsku rehabilitaciju bolesti
srca, pluća i reumatizma
O P A T I J A

Primljeno: 16-05-2023

Org.jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
THALASSOTHERAPIA	01-111-00/23/406	B	

THALASSOTHERAPIA
KLINIKA ZA LIJEČENJE, REHABILITACIJU I PREVENCIJU BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA

PREPORUKE ZA POSTUPANJE NAKON PROGLAŠNJA PREKIDA EPIDEMIJE COVID 19

Temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 11. svibnja 2023 "Preporuke za postupanje nakon proglašenja prekida epidemije COVID 19 Verzija 24" te „ Preporuke za nošenje maski u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom. Verzija 1“, Povjerenstvo za suzbijanje bolničkih infekcija Specijalne bolnice za rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizama donosi sljedeće preporuke za postupanje u razdoblju nakon što je proglašen prekid epidemije COVID 19:

Testiranje:

- Svim simptomatskim osobama (pacijenti i zdravstveni djelatnici) s postavljenom kliničkom sumnjom na COVID-19
- Preporučujemo testiranje na SARS-CoV-2 djelatnicima zdravstvenih ustanova prije povratka na posao ako:
 - imaju simptome kompatibilne s COVID-19,
 - su sudjelovali na većim okupljanjima na kojima se nisu poštivale mjere za sprječavanje širenja kapljičnih infekcija; sve to unazad 14 dana.

Izolacija:

- Preporuča izolaciju za osobe zaražene virusom SARS-CoV-2 koje se nalaze na bolničkom liječenju
- Kod tih osoba izolacija traje pet dana od početka bolesti (simptomatske osobe), odnosno od dana kad je uzet bris koji je pozitivan na SARS-CoV-2 (asimptomatske osobe). Preporučljivo je da još pet dana (do desetog dana od početka bolesti/pozitivnog brisa) koriste FFP2 maske ako to njihovo zdravstveno stanje dozvoljava.
- Ukoliko stanje bolesnika ne zahtjeva akutno bolničko liječenje preporuča se da se izolacija obavi u kućnim uvjetima.

Mjere opreza:

- Zdravstvenim djelatnicima preporučuje se da nose FFP2 masku 10 dana od zadnjeg bliskog kontakta s bolesnikom i izbjegavaju bliske kontakte koliko je moguće s obzirom na radne zadatke. Preporučljivo je da se testiraju odmah po izloženosti, potom svaka tri dana i završno deseti dan nakon zadnjeg izlaganja, pri čemu mogu sami provesti testiranje.
- Preporučuje se također da izbjegavaju veća okupljanja te posebice kontakt sa starijim osobama, kroničnim bolesnicima, trudnicama i imunokompromitiranim osobama.
- Dodatno, i drugi bolesnici koji zahtijevaju medicinsku skrb (primjerice, pri upućivanju na objedinjeni bolnički hitni prijem ili na specijalističko-konzilijarnu obradu odnosno premještaj u ustanovu socijalne skrbi), ako se kod izdavanja uputnice na temelju anamneze procijeni visoki rizik izloženosti infekciji preporuča se testiranje na SARS-CoV-2.


Preporuke za nošenje maski:

- Preporučuje se korištenje medicinskih maski ili maski za lice za osoblje, posjetitelje i pacijente koji nemaju zdravstvene kontraindikacije za nošenje maski, kada se nalaze u zatvorenom prostoru s više ljudi u kojem nije moguće održavati fizički razmak veći od metar i pol.
- Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija zadržava pravo da, u skladu s pojedinačnom situacijom, može obvezati određene kategorije djelatnika, korisnika, posjetitelja na nošenje medicinskih maski ili maski za lice.

U Opatiji, 16. svibnja 2023. godine

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
Predsjednik Povjerenstva za suzbijanje bolničkih infekcija
Dr.sc. Damir Rajević, dr. med.

THALASSOTHERAPIA OPATIJA
KLINIKA ZA LIJEČENJE, REHABILITACIJU
I PREVENCIJU BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA


Dr.sc. Damir Rajević, dr. med.
specijalist interne medicine - kardiolog
0142180