



Thalassotherapia Opatija

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
bolesti srca, pluća i reumatizma

Ravnatelj:
prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.

BRONHOPROVOKACIJSKI TEST METAKOLINOM – UPUTA ZA PACIJENTE

1. Što je to bronhoprovokacijski test metakolinom?

Bronhoprovokacijski test metakolinom (metakolinski test) služi za dokazivanje pretjerane osjetljivosti (hiperreaktivnosti) sluznice bronha i pomoćno je sredstvo najčešće korišteno za dijagnostiku astme. Provodi se isključivo na **indikaciju specijaliste pulmologa.**

2. Kako izgleda testiranje?

Test se provodi tako da ispitanik učini bazičnu spirometriju a zatim dobiva inhalaciju nespecifičnog sredstva (metakolina) u točno određenoj koncentraciji u više navrata a nakon svake inhalacije se ponavlja spirometrija. Prate se spirometrijske vrijednosti do kraja testa ili do kriterija koji zadovoljavaju pozitivan nalaz. U slučaju razvoja poteškoća sa disanjem, test se prekida i ispitanik dobiva sredstvo za olakšanje disanja (salbutamol) te se monitorira do normalizacije nalaza. Procijenjeno trajanje testa je oko 50 minuta u slučaju da nema akutne pojave bronhospazma.

3. Kako se pripremiti za testiranje?

DAN PRIJE TESTA

Do 13h potvrditi svoj dolazak na testiranje pozivom na broj telefona na 051 202 619 ili 051 202 613 ili mailom na pulmologija@tto.hr

TEST SE NE PROVODI U SLJEDEĆIM STANJIMA:

Nekontrolirana kardiovaskularna stanja / akutni infarkt miokarda ili cerebrovaskularni inzult u posljednja 3 mjeseca, nekontrolirana hipertenzija, poznata aneurizma aorte, recentni operativni zahvat oka

Nemogućnost pravilnog izvođenja spirometrije te FEV1 < 60% predviđenog

Akutna upala dišnih puteva (prehlada, gripa i slično)/ potrebna je pauza od 6 tjedana

Cijepljenje živom vakcinom (morbilli, parotitis, rubeola, vodene kozice, žuta groznica) / potrebna je pauza od 3-6 tjedana

Trudnoća i dojenje

Maršala Tita 188/1, 51410 Opatija - Hrvatska • Tel. +385 (0)51 202 600 • Fax +385 (0)51 271 424
thalassotherapia-opatija@ri.t-com.hr • www.thalassotherapia-opatija.hr
IBAN: HR2724020061100109231



PRIJE TESTA POTREBNO JE IZOSTAVITI SLJEDEĆE LIJEKOVE:

- 1. Kratkodjelujući antikolinergici [ipratropij bromid (Atrovent)] izostaviti 12 sati**
- 2. Dugodjelujući antikolinergici [tiotropij (Spiriva, Braltus, Plubir, Acopair), tiotropij+olodaterol (Spiolto), umeklidinij (Incruse), umeklidinij+vilanterol (Anoro), akklidinij (Bretaris), glikopironij (Seebri), glikopironij + indakaterol (Ultibro)] izostaviti 72 sata**
- 3. Kratkodjelujući beta 2-adrenergički agonisti [salbutamol (Ventolin)]- izostaviti 6-8 sati**
- 4. Dugodjelujući beta2-adrenergički agonisti ili kombinacije [salmeterol (Serevent),, budezonid+formoterol (Symbicort, DuoResp, AirBuFo), beklometazon + formoterol (Foster), flutikazon propionate+salmeterol (Sretide, AirFluSal, Saldisk)] izostaviti kroz 36 h**
- 5. Ultra LABA [indakaterol (Onbrez), vilanterol, olodaterol, flutikazonfuroat+vilanterol (Relvar)] izostaviti kroz 48h**
- 6. Ksanitini (teofilin) izostaviti 24h**
- 7. Kofein i čokoladu te cigarete izostaviti barem 2 h prije testa**
- 8. Intenzivna tjelesna aktivnost/ izbjegavati barem 4h prije testa**

Terapija za astmu izuzev bronhodilatatora, može se nastaviti kada je svrha testiranja monitorirati odgovor na terapiju. Kromoni, inhalacijski kortikosteroidi i modifikatori leukotrijena ne trebaju se obustaviti osim ako svrha testiranja nije procjena protuupalnog učinka (prema indikaciji nadležnog pulmologa).

Ukoliko se na dan pretrage utvrdi nepoštivanje datih preporuka, testiranje neće biti obavljeno već će biti dodijeljen drugi termin.

Na dan pretrage nije potrebno biti na tašte, lagano doručkovati.

U slučaju nemogućnosti dolaska u dogovorenom terminu, molimo pravovremeno se odjaviti putem telefona 202 619, 202 613 ili na mail pulmologija@tto.hr .